

Som Tillæg og Rettelse til de af mig i Marts- og Aprilheftet for indeværende Aar meddelte Bemærkninger om *Peltogaster* og *Pachybdella* seer jeg mig istand til at tilføie, at en hyppig Forekomst af disse Snyltedyrr i Nordsøen bekræftes ved en Iagttagelse af Professor *O. Schmidt* i Jena, indflettet i en lille Artikel med Overskrift: „Im Seebade“ i *Giebels* og *Schallers: Das Weltall*, Zeitschrift für populäre Naturkunde, 1854, Nr. 3. Af denne Artikel, paa hvilken Hr. Dr. *Creplin* i Greifswalde velvillig har gjort mig opmærksom og som jeg nu har faaet Leilighed til at benytte, sees det, at af *Pachybdella*en „konnte man in Wangerooge täglich viele Hunderte bekommen“ og at af saadanne „die meisten Wangeroogenkrabben, jedoch nie der Taschenkrebs, trugen unter ihrem Hinterleibe eine auch wohl zwei“. Paa samme Sted, S. 19, har Prof. *Schmidt* givet en meget forstørret Figur af den nylig udklækkede Yngel, og af denne Figur, der stemmer ret vel med den af mig ovenfor omtalte Fig. 16 c. hos *Cavolini* og saaledes i det Hele viser dennes Rigtighed, fremgaaer det, at *Pachybdella*en ikke ret vel kan være omdannet af en anden Krebsform end af et Entomostracon. Saaledes bortfalder da den Antydning, som jeg S. 156-7 henstillede til nærmere Undersøgelse af Naturforkere, der havde Leilighed til at iagttage Dyret levende, om et muligt nærmere Baand mellem dette Snyltedyrr og Bopyriderne. Da *Schmidt* heller ikke har havt Leilighed til at iagttage andet end det første Stadium i Ungens Udvikling, umiddelbart efter dets Fremkommen af Ægget, maa det blive senere Iagttagelser forbeholdt at klare dels den Besynderlighed, hvorledes *Cavolini* har kunnet finde Lighed mellem den af ham iagttagne og afbildede Yngel og den af ham anførte Figur af *Cancer paludosus* i *Müllers Zool. Dan. tab. 48*, og dels det Forhold, hvori de liriopagtige Krebsdyrr staae til disse Snyltedyrr.

J. Steenstrup.
